



## POTENCIALES EVENTOS ADVERSOS DEL MEDICAMENTO DICLOFENACO

Creado: 02 Noviembre 2017

(/images/banner\_publicaciones/08-11-17Diclofenaco.jpg)

Como prevenir el Síndrome de Nicolau, un evento adverso secundario a la administración intramuscular inadecuada de medicamentos

Potenciales eventos adversos asociados a la administración intramuscular de **medicamentos incluyendo Diclofenaco**

### RECOMENDACIONES

Como prevenir el Síndrome de Nicolau, un evento adverso secundario a la administración intramuscular inadecuada de medicamentos



- Realizar lavado de manos con agua y jabón o con un preparado a base de alcohol, sin olvidar las muñecas y los espacios entre los dedos, durante al menos 30 segundos y secado de manos con toalla de un solo uso.
- Nunca mezclar medicamentos (por ejemplo, penicilina con anti-inflamatorios) en la misma jeringa para una única administración.
- Limpiar y desinfectar el área de punción antes y después de la administración del medicamento.
- Nunca reutilizar jeringas o agujas
- Usar material estéril
- Aplicar el medicamento en el cuadrante superior externo del glúteo.
- Aspirar la jeringa antes de aplicar el medicamento para verificar que el medicamento no se está inyectando en un vaso sanguíneo.
- Utilizar diferentes áreas musculares si se va aplicar más de una inyección o grandes volúmenes.

Invima MINSALUD GOBIERNO DE COLOMBIA

Ante los cinco casos reportados de fascitis necrotizante y/o Síndrome de Nicolau en pacientes que recibieron Diclofenaco intramuscular, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) se permite dar a conocer las siguientes recomendaciones sobre los potenciales eventos adversos asociados a la administración intramuscular de medicamentos incluyendo Diclofenaco:

- Realizar lavado de manos con agua y jabón o con un preparado a base de alcohol, sin olvidar las muñecas y los espacios entre los dedos, durante al menos 30 segundos y
- secado de manos con toalla de un solo uso.
- Limpiar y desinfectar el área de punción antes y después de la administración del medicamento.
- Usar material estéril.
- Nunca reutilizar jeringas o agujas.
- Nunca mezclar medicamentos (por ejemplo, penicilina con anti-in amatorios) en la misma jeringa para una única administración.
- Aplicar el medicamento en el cuadrante superior externo del glúteo.
- Aspirar la jeringa antes de aplicar el medicamento para verificar que el medicamento no se está inyectando en un vaso sanguíneo.
- Utilizar diferentes áreas musculares si se va aplicar más de una inyección o grandes volúmenes.